



دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فناوری
مدیریت امور پژوهشی



مرداد ماه ۱۴۰۴

نشست خبری برای ارائه پیام پژوهشی

نشست خبری برای ارائه پیام پژوهشی در روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

ساعت برگزاری: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ظهر

مکان برگزاری: سالن همایش‌ها

موضوع: گزارش فعالیت‌های پژوهشی

حاضرین: اعضای هیأت مدیره و هیأت مدیره



دکتر مهناز پژمان ثانی هستم دانشیار غدد و متابولیسم بیمارستان دکتر شریعتی-مرکز تحقیقات علوم پزشکی تهران. با توجه به حیطه تخصصی اینجانب در مورد بیماری های غدد و متابولیسم و تشخیص و درمان با بیماری های غده فوق کلیوی (بیماری کوشینگ تحت بالینی) وجود داشت تصمیم به انجام پژوهش به صورت مرور نظامند در این حیطه گرفته شد با هدف برطرف کردن یکی از چالش های سلامت

دکتر مهناز پژمان ثانی ، دکتر شهرزاد محسنی ، دکتر محمد مهدی خادم بشیری ، دکتر رشا اطلسی ، دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ، دکتر باقر لاریجانی

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مخاطبان نتایج پزشکان و مراقبین سلامت می باشند برای تصمیم گیری مفیدتر برای بیماران مبتلا به کوشینگ تحت بالینی

با این روش می توان به تشخیص و درمان مبتلایان به کوشینگ پرداخت.

مقایسه ی پیامد اختلالات همراه با سندرم کوشینگ تحت بالینی بین دو روش جراحی و درمان محافظه

با این روش می توان به تشخیص و درمان مبتلایان به کوشینگ پرداخت.

این مطالعه نشان داد که ترشح خودکار کورتیزول از آدرنال با احتمال بالا برای بیماری های همزمان از جمله فشار خون بالا و کاهش تراکم استخوان مرتبط است. این مطالعه مزیت آدرنالکتومی نسبت به درمان محافظه کارانه برای بیماری های همراه نشان داد. علاوه بر این، بیمارانی که تحت عمل آدرنالکتومی قرار گرفتند بهبود کلی در عوامل خطر قلبی عروقی نسبت به درمان محافظه کارانه دیده شد. تحقیقات بیشتر و دقیق تر به ویژه از نظر مدت زمان پیگیری و حجم نمونه برای تصمیم گیری دقیق مورد نیاز است

با این روش می توان به تشخیص و درمان مبتلایان به کوشینگ پرداخت.

نتیجه گیری: در این مطالعه، نتایج نشان داد که

- با توجه به اینکه یکی از چالش های پزشکان فوق تخصص غدد در مورد بهترین روش درمانی برای بیماران مبتلا به ترشح خودکار کورتیزول از غده فوق کلیه بود این مطالعه انجام شد و نتیجه پژوهش به پزشکان غدد و متابولیسم و جراحان غدد درون ریز کمک می کند که بهترین درمان برای بیماران مبتلا به بیماران کوشینگ تحت بالینی انجام شود

نتیجه گیری: در این مطالعه، نتایج نشان داد که

- این مطالعه نشان داد که ترشح خودکار کورتیزول از آدرنال با احتمال بالا برای بیماری های همزمان از جمله فشار خون بالا و کاهش تراکم استخوان مرتبط است. علاوه بر این، بیمارانی که تحت عمل غده فوق کلیه قرار گرفتند بهبود کلی در عوامل خطر قلبی عروقی نسبت به درمان محافظه کارانه دیده شد. تحقیقات بیشتر و دقیق تر به ویژه از نظر مدت زمان پیگیری و حجم نمونه برای تصمیم گیری دقیق مورد نیاز است

با توجه به اینکه یکی از چالش های پزشکان فوق تخصص غدد در مورد بهترین روش درمانی برای بیماران مبتلا به ترشح خودکار کورتیزول از غده فوق کلیه بود این مطالعه انجام شد و نتیجه پژوهش به پزشکان غدد و متابولیسم و جراحان غدد درون ریز کمک می کند که بهترین درمان برای بیماران مبتلا به بیماران کوشینگ تحت بالینی انجام شود. جراحی غده فوق کلیه نسبت به درمان محافظه کارانه، با بهبودی در عوامل خطر قلبی عروقی از جمله فشارخون همراه بوده است

.....

.....

.....

.....

مدت زمان پیگیری بیماران در هر دو روش جراحی و درمان محافظه کارانه مشخص نشده که کافی بوده است یا خیر

.....

.....

طراحی و اجرای مطالعات با کیفیت بالا که مدت زمان پیگیری بیماران دو گروه (تحت جراحی آدرنالکتومی / درمان محافظه کارانه) را هم در نظر قرار گیرد

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... ()

DOI 10.3389/fendo.2024.137471

.....

Email: mpsani@sina.tums.ac.ir

Tel: 09123405426

.....

-Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, Tabarin A, Sahdev A, Newell-Price J, et al. European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. *Eur J Endocrinol.* (2023) 189:G1–G42. doi: 10.1093/ejendo/lvad066

-Fleseriu M, Auchus R, Bancos I, Ben-Shlomo A, Bertherat J, Biermasz NR, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. *Lancet Diabetes Endocrinol.* (2021) 9:847–75. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00235-7

-Araujo-Castro M, Mínguez Ojeda C, Sánchez Ramírez MN, Gómez Dos Santos V, Pascual-Corrales E, Fernández-Argüeso M. Adrenalectomy improves blood pressure control in nonfunctioning adrenal incidentalomas and glycemic and lipid control in patients with autonomous cortisol secretion. *Endocrine*. (2022) 78:142–50. doi: 10.1007/s12020-022-03120

- [How to write a business plan](#)

.....

.....

.....

.....

عنوان طرح:

DOI 10.3389/fendo.2024.137471